

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

### ТЕРЖИНАН

**Регистрационный номер:** П N015129/01

**Торговое название:** ТЕРЖИНАН

**Лекарственная форма:** таблетки вагинальные

**Состав** на 1 таблетку

#### *Действующие вещества:*

Тернидазол.....0,2 г  
Неомицина сульфат .....0,1 г или 65000 МЕ  
Нистатин ..... 100 000 МЕ  
Преднизолонa натрия метасульфобензоат..... 0,0047 г,  
эквивалентно преднизолону .....0,003 г

#### *Вспомогательные вещества:*

Крахмал пшеничный..... 0,264 г  
Лактоза моногидрат..... q.s. до 1,2 г  
Кремния диоксид коллоидный..... 0,006 г  
Магния стеарат..... 0,01 г  
Карбоксиметилкрахмал натрия..... 0,048 г

#### **Описание**

Таблетки светло-желтого цвета с возможными вкраплениями более темных или светлых оттенков, плоские, продолговатой формы с фаской по краям и с напечаткой в виде буквы «Т» с обеих сторон.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробное средство комбинированное (антибиотик-аминогликозид + противомикробное и противопротозойное средство + противогрибковое средство + глюкокортикостероид).

**Код АТХ:** [G01BA]

#### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат для местного применения в гинекологии. Оказывает противомикробное, противовоспалительное, противопротозойное, противогрибковое действие; обеспечивает целостность слизистой оболочки влагалища и постоянство pH.

*Тернидазол* – противогрибковое средство из группы производных имидазола, снижает синтез эргостерола (составной части клеточной мембраны), изменяет структуру и свойства клеточной мембраны. Оказывает трихомонацидное действие, активен также в отношении анаэробных бактерий, в частности гарднерелл.

*Неомицин* – антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов. Действует бактерицидно в отношении грамположительных (*Staphylococcus*, *Streptococcus pneumoniae*) и грамотрицательных (*Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella sonnei*, *Proteus spp.*) микроорганизмов; в отношении *Streptococcus spp.* малоактивен.

Устойчивость микроорганизмов развивается медленно и в небольшой степени.

*Нистатин* – противогрибковый антибиотик из группы полиенов, высокоэффективен в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*, изменяет проницаемость клеточных мембран и замедляет их рост.

*Преднизолон* – дегидрированный аналог гидрокортизона, оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое, противоэксудативное действие.

### **Показания для применения**

Лечение вагинитов, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, в т.ч.:

- бактериальный вагинит;
- трихомониаз влагалища;
- вагинит, вызванный грибами рода *Candida*;
- смешанный вагинит.

Профилактика урогенитальных инфекций/вагинитов, в том числе:

- перед гинекологическими операциями;
- перед родами и абортom;
- до и после установки внутриматочных средств;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед гистерографией.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Возможно применение препарата со второго триместра беременности.

Применение препарата в первом триместре беременности и в период лактации возможно только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода или младенца.

### **Способ применения и дозы**

Для вагинального применения.

Одну таблетку вводят глубоко во влагалище в положении «лежа» перед сном. Перед введением во влагалище таблетку следует подержать в воде в течение 20-30 секунд.

После введения необходимо полежать 10 - 15 минут.

Средняя продолжительность лечебного курса терапии – 10 дней; в случае подтвержденного микоза может быть увеличена до 20 дней; средняя продолжительность профилактического курса – 6 дней.

### **Побочное действие**

Чувство жжения, зуд и раздражение во влагалище (особенно в начале лечения).

В отдельных случаях возможны аллергические реакции.

### **Передозировка**

Нет данных о случаях передозировки.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не выявлено.

### **Особые указания**

В случае лечения вагинитов, трихомониаза рекомендуется одновременное лечение половых партнеров.

Не следует прекращать лечение во время менструации.

### **Форма выпуска**

Таблетки вагинальные.

По 6 или 10 таблеток в стрип (алюминиевая фольга), один стрип с инструкцией по применению упакован в картонную пачку.

### **Срок годности**

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

### **Владелец регистрационного удостоверения:**

Лаборатории БУШАРА-РЕКОРДАТИ

70, авеню дю Женераль де Голль, иммебль «Ле Вильсон», 92800 Пюто, Франция

### **Производитель:**

СОФАРТЕКС

21, рю дю Прессо, 28500 Вернуйе, Франция

### **Организация, принимающая претензии:**

ООО «Русфик»

123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 6, пом. IАЖ

тел.: +7 (495) 225-80-01,

факс: +7 (495) 258-20-07

E-mail: info@rusfic.com